„Ja, und wie jetzt?“

Ergotherapeutische Diagnostik und
Behandlungsansätze bei Störungen
der exekutiven Funktionen nach
erworbener Hirnschädigung
in der post-akuten Langzeitrehabilitation

Ja, und wie jetzt?

**DIE ARBEIT DER ZUKUNFT
GESTALTEN WIR!**

1. MAI 2015

Ziele des Vortrags

- Information über ein komplexes Störungsbild
- Empfehlungen zu ergotherapeutischer Diagnostik und Therapie
- Hinweise zu Möglichkeiten der Abgrenzung und Entlastung bei „schwierigen Patienten“
- Darstellung der Bedeutung von Betätigung/ Aktivität im Alltag für Diagnostik und Therapie

P.A.N. Zentrum

- Stationäre Einrichtung für **Post-Akute Neurorehabilitation** der Fürst Donnersmarck-Stiftung in Berlin Frohnau
- Brücke zwischen Rehabilitationsklinik und Auszug in eine ambulante Wohnform für 2 -2,5 Jahre
- Menschen mit erworbenen Schädigungen des Nervensystems zwischen 16-55 Jahren
- 66 Plätze in 5 Wohngruppen bis 15 Personen mit unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung
- Ziel des Aufenthaltes ist es die Teilhabefähigkeit der Rehabilitanden so zu fördern, dass sie nach dem Aufenthalt ein weitgehend selbstständiges Leben führen und möglichst ambulant wohnen können.

Rehabilitanden 2014

Zugänge

- 75% Rehakliniken
Berlin/Brandenburg
- 11% Phase F/
Pflegeeinrichtungen
- 8% zu Hause
- 5% WG etc.
- 1% Krankenhaus

Auszüge

- 73% ambulante Wohnform
- 9% stationäre Pflegeeinrichtung
- 9% stationäre Eingliederungshilfe
- 9% sonstige

Schwerpunkte der Wohngruppen im Rehabilitationsbereich

Wohngruppen mit verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen:

- Rehabilitanden im Alter von ca. 18 – 40 Jahren
- Rehabilitanden im Alter von ca. 40 – 59 Jahren
- Rehabilitanden mit Diagnosen im Bereich
Aphasie, Dysarthrie, Dysphagie (Aphasikergruppe)
- Rehabilitanden mit Orientierungsstörungen
und kognitiven Defiziten
- Auszugsbereich mit kleiner WG und Apartments

Schwerpunkte der Wohngruppen im Rehabilitationsbereich

Warum verschiedene Schwerpunkte ?

- Aufteilung in verschiedene Altersstufen soll Menschen mit ähnlichen Interessen und bisherigen Lebensläufen zusammenbringen, Ziel: Sozialkontakte und gemeinsame Aktivitäten fördern
- In Gruppen mit Ausrichtung nach speziellen Krankheitsbildern werden abgestimmte Angebote gemacht (z.B. Aphasikergruppe) und/oder der Alltag entsprechend angepasst (zusätzliche Kalender, intensivere Strukturierung)
- Im Wohnbereich mit WG und Apartments wird offensichtliche Strukturierung vermindert, um Wohnen ohne /mit geringeren Hilfen vorzubereiten

Exekutive Funktionen und ihr Störungsbild

Lokalisation exekutiver Funktionen

- Sowohl die Lokalisation der exekutiven Funktionen als auch die Art der Läsionen bei Dysexekutivem Syndrom (DES) wird seit einiger Zeit diskutiert
- DES gehäuft bei Schädigungen des frontalen Kortex
- Schädigungen anderer Areale z. B. Basalganglien, Temporal- oder Parietallappen und deren Verbindungsstrukturen

Lokalisation exekutiver Funktionen

Klassische Auffassung

DysExekutivSyndrom durch diffuse oder fokal bedingte Schädigungen des präfrontalen Kortex, des frontalen Marklagers und ihrer subkortikalen Verbindungen verursacht.
Frontalhirnsyndrom = Synonym für DES

Neue Annahme

Gehirn besteht aus Netzwerken und Schleifen, kein hierarchischer Aufbau integrative Netzwerke zwischen präfrontalem Kortex, medianem Thalamus, Globus pallidus, nukleus caudatus und Kleinhirn. Schädigungen dieser Regionen können ähnliche Symptome wie bei einem Frontalhirnsyndrom hervorrufen. (Matthes v. Crammon 2006, Prosiegel 2007, Müller 2007, Goldenberg 2007).

Definition exekutiver Funktionen

- Exekutivfunktionen aus dem Englischen - executive functions - Führungs-, Leitungs- und Steuerungsfunktionen (G. Matthes-von Cramon 2006)
- kognitive Prozesse des Planens und Handelns, die als wesentliche Komponenten menschlicher Informationsverarbeitung und Handlungssteuerung beschrieben werden (Müller 2007)

Definition exekutiver Funktionen

- Handlungen initiieren, planen, organisieren
- Entscheidungen treffen
- Beurteilung der Handlung
- Zentrale Bedeutung für selbständige Lebensführung, Voraussetzung für Anpassung an neuartige Situationen (Müller 2007)

Einteilung exekutiver Funktionen

- Die meisten Autoren sehen die exekutiven Funktionen als Konstrukt, welches verschiedene unabhängige Prozesse umfasst
- Gleichzeitige Betrachtung von Persönlichkeit und Awareness

Einteilung exekutiver Funktionen

Goldenberg 2002

- Sozialverhalten
- Planen und Problemlösen
- Affekt
- Störungseinsicht

Einteilung exekutiver Funktionen

Müller 2013: Regenschirmbegriff

Einteilung exekutiver Funktionen

Müller & Münte 2009

- Arbeitsgedächtnis und Monitoring
- Kognitive Flexibilität
- Planerisches und problemlösendes Denken

Einteilung exekutiver Funktionen

- Arbeitsgedächtnis eng verflochten mit Aufmerksamkeitsfokussierung, Hemmung irrelevanter Informationen, Aufgabenmanagement, Planen, Zielüberwachung, Sequenzierung (Prosiegel 2002)

Einteilung exekutiver Funktionen

Prosiegel 2002

- Primäre exekutive Funktionen (primär-kognitiv)
- Sekundäre exekutive Funktionen (psychisch)

Einteilung exekutiver Funktionen

Götze & Kolster 2013

Klinisches Bild des Dysexekutiven Syndroms (DES)

Klinisches Bild des Dysexekutiven Syndroms (DES)

- Konglomerat vieler einzelner Symptome
- Art und Ausprägung der Störungen sowie die Auswirkungen auf Alltag und Umwelt individuell verschieden (Götze & Kolster 2009)
- abhängig von der Art, der Lokalisation und dem Ausmaß der Hirnschädigung sowie auch von prämorbidem Faktoren (Alter, Bildung, Persönlichkeitsstil)
- Breites, heterogenes Störungsbild – unterschiedliche Ausprägung der Teilaspekte (Müller 2007)

Einteilung exekutiver Funktionen

Götze & Kolster 2013

Störungen der
Handlungskontrolle

Antriebs-
störungen

Störungen des Sozialverhaltens

Störungen in den 3 Domänen

1. Störungen der Handlungskontrolle

- Handlungen können nicht geplant und dabei antizipiert werden
- mangelnde Umstellfähigkeit
- fehlendes "Monitoring"
- mangelnde Plausibilitätskontrolle während der Handlung bzw. keine notwendige Anpassung der Handlung
- Fehler im Handlungsablauf werden nicht erkannt
- keine angemessenen Problemlösungen

Patientenbeispiel

Patientenbeispiel

Patientenbeispiel

Störungen in den 3 Domänen

2. Antriebsstörungen

- Passivität gegenüber notwendigen und förderlichen Aktivitäten in Alltag, Beruf und Freizeit
- fehlende Initiierung von Handlungen bzw. Unterbrechung dieser
- Ideenmangel
- scheinbare Teilnahmslosigkeit und Unmotiviertheit
- Schwierigkeiten aktiven Kontakt zu halten z. B. zu Freunden, Arbeitskollegen, ...

Störungen in den 3 Domänen

3. Störungen des Sozialverhaltens

- Fehlendes Gespür für und Nicht-Einhalten sozialer Regeln
- Überschätzung eigener Fähigkeiten, Nichterkennen von Defiziten
- mangelnde Empathie, aggressive Ausbrüche
- beeinträchtigtes Kommunikationsverhalten
- Schwierigkeit, Kritik angemessen anzunehmen oder zu geben
- mangelnde Initiative bei der Aufnahme und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen
- Gefährdung sozialer Beziehungen durch scheinbare Interessenlosigkeit und Gleichgültigkeit
- überangepasstes Verhalten, passives "Mitlaufen"

Weitere Unterteilung (Prosiegel 2002, Müller 2013)

- **Plussymptome** (psychopathisches Syndrom) wie gestörte Impulskontrolle mit verbal- oder handlungsaggressiven Tendenzen, Tendenz zu kindlichem bzw. kindischem Verhalten
- **Minussymptome** (pseudodepressives Syndrom – bei oberflächlicher Betrachtung besteht eine Ähnlichkeit zu depressiven Störungen) wie Apathie, Antriebsminderung (Hypobulie) bis hin zur Abulie (Verlust jeglichen selbstgenerierenden Verhaltens), Interessenlosigkeit, affektive Indifferenz (Gleichgültigkeit)

Awareness

- In aller Regel kommt es begleitend zu der Störung der exekutiven Funktionen zu einer Unawareness für die Störungen (alle bisher genannten Quellen)
- unrealistisch-optimistische Sicht der eigenen Hirnleistungsstörung bzw. ihrer Alltagskonsequenzen

DIAGNOSTIK

Diagnostik - Leitlinien

S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie von exekutiven Dysfunktionen bei neurologischen Erkrankungen (2011):

„Jede Untersuchung bei Verdacht auf exekutive Dysfunktionen sollte mindestens je ein Verfahren zum Arbeitsgedächtnis, zum Monitoring, zur kognitiven Flüssigkeit und Flexibilität und zum planerischen und problemlösenden Denken umfassen.(B)“

„Die Verhaltensbeobachtung des Patienten und die umfassende Befragung der Angehörigen ist bei exekutiven Dysfunktionen ein zentraler Bestandteil [...] Wertvolle Informationen liefern Eigen- und Fremdanamnese bzw. der Einsatz von Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen.“

Diagnostik - Neuropsychologie

- Anwendung einzelner Testinstrumente zur Erfassung von Teilfunktionen der EF: Turm von London (TL-D, Planen und Problemlösung)
- Anwendung von Testbatterien mit alltagsähnlichen Situationen: Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)
- Verhaltensbeobachtung während der Testung
- Befragung von Patient und Angehörigen: Fragebögen zum Dysexekutiven Syndrom (DEX)

Diagnostik - Neuropsychologie

Fragebögen zum Dysexekutiven Syndrom (DEX):

- Selbst- und Fremdeinschätzung durch Patient und Angehörige – 2 Versionen
- Fragebogen mit 20 Aussagesätzen:
 - „**Ich** handle ohne nachzudenken und mache das erste, was mir in den Sinn kommt.“ -> „**Sie/Er** handelt ohne.....“
 - „Ich verliere schon bei Kleinigkeiten die Beherrschung.“
 - „Ich kann nur schlecht bei der Sache bleiben und bin leicht ablenkbar.“

Bewertung auf 5 Punkte Likert-Skala von 0-4

Diagnostik - Neuropsychologie

Einschränkungen der traditionellen Tests (u.a. Müller 2013):

- stark vorstrukturierte, kurze Aufgaben (Teilschritte)
- Handlungsdurchführung durch Untersucher gefordert (Antrieb, Initiierung)
- Testaufgaben bilden keine Alltagssituationen ab
- Tests erfordern weitere Fähigkeiten wie Sprache, Kulturtechniken, Gedächtnisfunktionen (nicht nur rein EF)

**!!stark eingeschränkte Aussagefähigkeit in Bezug auf
Alltagsrelevanz!!**

Diagnostik - Ergotherapie

4 grundlegende Vorgehensweisen:

- Gezielte Verhaltensbeobachtung und Analyse in relevanten, aber nicht automatisierten/ routinierten Alltagssituationen (Antrieb, Handlungskontrolle, Sozialverhalten)
- Befragung des Patienten (Sozialverhalten/Awareness)
- Befragung der Bezugspersonen (Sozialverhalten/prämorbide Persönlichkeit)
- Isolierte Testung einzelner kognitiver/exekutiver Fertigkeiten (Handlungskontrolle: u.a. Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit)

Diagnostik - Ergotherapie

Gezielte Verhaltensbeobachtung in relevanten, aber nicht automatisierten/ routinierten Alltagssituationen

1. Nicht standardisiert:

Beobachtung von bedeutsamen, selbst gewählten
Betätigungen im bekannten Umfeld

(u.a. Götze & Zenz 2010; Götze & Kolster 2013; Müller 2013)

Diagnostik im Alltag

Diagnostik - Ergotherapie

Gezielte Verhaltensbeobachtung in relevanten, aber nicht automatisierten/ routinierten Alltagssituationen

2. standardisiert:

- AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
- EFPT (Executive Function Performance Test)
- ESI (Evaluation of Social Interaction)

ET Diagnostik - AMPS (Fisher et al. 2013)

- Ziel: Erfassung der Ausführungsqualität von vertrauten Alltagsaufgaben (p/iADL)
- Beobachtung und Analyse von mindestens 2 aus 125 standardisierten Aufgaben unter den Aspekten:
 - - physische Anstrengung -Sicherheit
 - - Effizienz -Hilfebedarf

sowie anhand von 16 motorischen und 20 prozessbezogenen ADL-Fähigkeitsitems

- Computergestützte Auswertung und Verlaufsdokumentation

ET Diagnostik - AMPS (Fisher et al. 2013)

Warum speziell auch für Betroffene mit DES geeignet?

- Beobachtung/Testung erfolgt dort, wo die Probleme auftreten – in relevanten Alltagssituationen!
- differenzierte Problemanalyse - häufig auftretende Schwierigkeiten spiegeln sich vor allem in den prozessbezogenen ADL-Fähigkeitsitems wieder
- Unterstützt bei Aussagen zu Kompetenz, zum Therapieansatz, zum Hilfebedarf für alleine wohnen

ET Diagnostik - AMPS (Fisher et al. 2013)

Motorische ADL-Skala

Zu erwartende Spannweite
 (aufgrund des derzeitigen
 Alters: 22 Jahre)

10/22/2014

Entsprechende Gesamtqualität der ADL-Aufgabenausführung, wie sie normalerweise bei Personen mit der gleichen motorischen ADL-Fähigkeit beobachtet wird

Prozessbezogene ADL-Skala

Zu erwartende Spannweite
 (aufgrund des derzeitigen
 Alters: 22 Jahre)

10/22/2014

Entsprechende Gesamtqualität der Aufgabenausführung, wie sie normalerweise bei Personen mit der gleichen prozessbezogenen ADL-Fähigkeit beobachtet wird

ET Diagnostik - AMPS (Fisher et al. 2013)

Vergleich unserer erhobenen Daten (2014/2015)

Klient	Diagnose	Alter	M-Wert (<2)	P-Wert (<1)	M-Wert (<2)	P-Wert (<1)
Herr M	SHT	22	2,6	0,7	-	-
Frau Gl	SHT	45	2,6	1,3	-	-
Herr N	SHT	43	1,1	0,4	-	-
Frau S	Hirntumor, Blutung	35	2,2	0,2	2,7	0,5
Herr A	Blutung	35	2,9	0,1	-	-
Frau G	Infarkt Li	41	1,8	0,6	1,8	1,0

ET Diagnostik - AMPS (Fisher et al. 2013)

Einsatz in Studien bei SHT und Apoplex :

- Dawson DR et al. (2013). Occupation-Based Strategy Training for Adults With Traumatic Brain Injury: A Pilot Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation; 94(10) :1959-63
- Goverover Y et al. (2007). Treatment to improve self-awareness in persons with acquired brain injury. Brain Injury; 21(9) :913-23
- Bjorkdahl A et al. (2006). Does a short period of rehabilitation in the home setting facilitate functioning after stroke? A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation; 20(12) :1038-49

ET Diagnostik - EFPT (Baum CM et al. 2008, 2013)

Executive Function Performance Test

- Speziell für EF entwickelt, basierend auf Kitchen Task Assessment
- Beobachtung des Klienten bei der Durchführung von 4 vorgegebenen Alltagsaufgaben (IADLs):
 - Kochen von Haferbrei
 - Einholen einer telefonischen Auskunft
 - Einnahme von Medikamenten
 - Bezahlen einer Rechnung

ET Diagnostik - EFPT (Baum CM et al. 2008, 2013)

Ziele:

- Erfassung der Performance in den Bereichen:
Initiierung, Organisation, Sequenzierung, Sicherheit und
Beurteilung, Beendigung
- Erfassung des notwendigen Hilfebedarfs für die
erfolgreiche Durchführung !

→ durch Nutzung eines abgestuften, standardisierten
Cueing-Systems (Skala 0-5) bei der Durchführung erfolgt
zugleich die Einstufung des Hilfebedarfs

ET Diagnostik - EFPT (Baum CM et al. 2008, 2013)

Alle Materialien sind frei verfügbar:

<http://www.ot.wustl.edu/about/resources/executive-function-performance-test-efpt-308>

ET Diagnostik - Neue Wege gehen

Evaluation of Social Interaction (ESI) Fisher & Griswold 2009

- Erfassen von Kommunikations- und Interaktionsfertigkeiten mittels Beobachtung in natürlichen, relevanten Alltagssituationen
- Erste Pilot Studie 2010: *„Using the Evaluation of Social Interaction in a community-based program for persons with traumatic brain injury“* Scandinavian Journal of Occupational Therapy

www.innovativeotsolutions.com

-
- Nächster Kurs: November 2015 in Berlin

ET Diagnostik

Befragung des Patienten

Bemerkt der Patient Veränderungen in seinem Alltag/
Alltagskompetenz? Wenn ja, in welchen Situationen?
Sieht er einen Therapiebedarf in den vorhandenen
Schwierigkeiten? **Awareness**

ET Diagnostik

Befragung der Bezugspersonen

Wie erlebt er seinen Angehörigen? Was hat sich im Alltag verändert? **Sozialverhalten, Antrieb, HK**

Welche Persönlichkeitsmerkmale sind bekannt, jetzt jedoch verstärkt? **prämorbid Persönlichkeit**

Was weiß der Angehörige über das Störungsbild?

ET Diagnostik

Ergänzend Nutzung von kognitivem Übungsmaterial:

- „Dann mache ich mir einen Plan“ (Müller/Harth/Klaue 2008)
- „Handeln lernen“ (Pechtold & Jankowski 2000)
- RehaCom Version 6 mit Screeningmöglichkeit

Fazit zur Diagnostik

- Zentrales Element in der Diagnostik ist die gezielte Verhaltensbeobachtung (stand./ nicht standardisiert) in nicht routinierten Alltagssituationen, denn nur sie liefert verlässliche Aussagen über die Auswirkungen des Störungsmusters im Alltag. Diese Kompetenz liegt im Bereich Ergotherapie!

Prognose von DES

- Langfristige Alltagsauswirkungen auf alle Bereiche der Teilhabe (Gillen 2015)
- Problemlagen in der sozialen Reintegration werden nicht oder zu spät erkannt (Reuther 2014)
- Positive Einflussfaktoren: soziales Umfeld/ Angehörige, stufenweise, eng begleitete, nicht zu früh begonnene berufliche Reintegration (Müller 2013)

Therapie

Empfehlungen und angewandte Methoden

Therapieempfehlungen Neuropsychologie

- Kognitiv übende Verfahren
- Methoden des Verhaltensmanagements
- Modifikation der Umwelt

Awareness

Therapieempfehlungen Ergotherapie (Götze & Kolster 2013)

Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung

Therapie
des Dysexekutiven
Syndroms
in relevanten
Alltagshandlungen
einfach,
komplex
Variationen
unter Stress

Sukzessive
Vertiefung der
therapeutischen
Beziehung

Erarbeitung
der **Awareness**

Konkrete Aktivität
auf Metaebene
für andere Situationen
vorausschauend

Therapieempfehlungen Ergotherapie

(Götze & Kolster 2013)

- Training kognitiver Funktionen durch apparative Verfahren
- Verhaltensmanagement
- Behandlung in Alltagssituationen

Therapieempfehlungen Ergotherapie (Götze & Kolster 2013)

- Therapeutische Grundtechniken:
Reflektieren, Einschleifen von Handlungsrouinen
- Therapeutische Strategien:
Cueing, Coaching, Modelling, Shaping, Chaining
- Verhaltenstherapeutische Techniken:
Selbstinstruktionstraining, Verstärkerplan,
Token – Programme in Absprache mit
Neuropsychologen

Therapieempfehlungen Ergotherapie Gillen (2009) USA

Categories of Interventions for those living with impairments of the executive functions

- Training in metacognitive strategies
- Environmental modifications
- Compensatory strategies
- Task-specific training

Angewandte Therapiemethoden

Erarbeitung von Awareness

E-Rollstuhlfahrtraining

Datum Aufgabe	4.7.12		11.7.12		6.7.12
	S.	Th.	S.	Th.	S.
auf Geschwindigkeit achten	2	4	9	8	10
vor überqueren Schulterblick	9	9	9	9	9
Auf der Fußgänger- überquerung Bordsteinkante!!! (AMPEL)	9	9	3	8	9
Ander Raueckelbereich Kein Umweg über der Bordsteinkante	10	10	10	10	10
beim parkenden Auto vorfahren gucken	10	—	9	9	—
beim Einparken auch Schulter- blick	2	2	2	8	10
!!! nicht umkehren	—	—	—	—	9

Nutzung von Selbst- und Fremdeinschätzung, Vor und nach der Durchführung

Erarbeitung Reflektion

Angewandte Therapiemethoden

Kognitiv übende Verfahren

Training von Planung, Arbeitsgedächtnis und Problemlösen

mit Computer- oder Papier-Stift-Programmen:

„Dann mache ich mir einen Plan“ Müller, Harth, Klaue 2008

RehaCom www.hasomed.de

Angewandte Therapiemethoden

Kognitiv übende Verfahren

Training von Planung, Arbeitsgedächtnis und Problemlösen

im Alltag: Tagesstruktur

Angewandte Therapiemethoden

Kognitiv übende Verfahren

Training von Planung, Arbeitsgedächtnis und Problemlösen

im Alltag: ADLs

Angewandte Therapiemethoden

Kognitiv übende Verfahren

Training von Planung, Arbeitsgedächtnis und Problemlösen

im Alltag: Wegetraining, Einkauf und Kochen

Angewandte Therapiemethoden

Methoden des Verhaltensmanagements

Token – Programme, Verstärkerplan, Time-out Methode

5x pünktlich

Eis essen

Angewandte Therapiemethoden

Methoden des Verhaltensmanagements

Selbstinstruktionstraining

Angewandte Therapiemethoden

Methoden des Verhaltensmanagements

angelehnt an Goal Management Training: ZIELTREPPEN

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrouinen

Hilfen zur Strukturierung Wochenplan

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
8 ⁰⁰				Massage			
9 ⁰⁰							
10 ⁰⁰	Ergo		Physio	Physio	KG-Gruppe		
11 ⁰⁰	KG-Gruppe			Psychologie		Stehen	
12 ⁰⁰							
15 ⁰⁰		Logo	Ergo	Logo	Ressourcen-gruppe		
16 ⁰⁰	Physio						
17 ⁰⁰		Stehen	Stehen	Stehen	Stehen		
	Duschen			Duschen			
					Physio	Massage	Ergo
							Psychologie

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrountinen

Hilfen zu Strukturierung Essensplan

Speiseplan vom 23.03.2015 bis 29.03.2015

	23.03.2015 Montag	24.03.2015 Dienstag	25.03.2015 Mittwoch	26.03.2015 Donnerstag	27.03.2015 Freitag	28.03.2015 Samstag	29.03.2015 Sonntag
1. Menü	Kartoffeluppe traditionell mit 2 Würstchen	Wurstschüssel mit Gemüse und Sauerkraut	Schneepretzel mit Butterbrot und Sauerkraut	Schüssel mit Lachs und Sauerkraut	Geschmortes mit Getreidegerichte und Sauerkraut	Milchreis mit Zucker und Zimt dazu Apfelsauce	Hähnchenfilet mit Butter (F. 2)
	2,3,4, C1	8, F	8, I, F	8, O, F	8, F, I	I	D, J
2. Menü	Vogelgeflügel Paprikaschote mit Kürbisse und Kartoffeln	Kornreis Eintopf mit frischen Kräutern und Kartoffeln	Grünkohl mit heißen Krüchen	Asia-Beefplatte mit Gemüse und sauciger Soße	Kükenquark mit Sauerkraut	Milchreis mit Zucker und Zimt dazu Apfelsauce	Hähnchenfilet mit Butter (F. 2)
	1, 2, C	C, I	I, F	E, D	I	I	Kompost
3. Menü	Spaghetti mit Bärlauch-Spinat, Pezzen mit Parmesan und Olivenöl dazu Rokokobrot	Kartoffel-Lauch-Platte mit Fischfiletschinken und Zitrus dazu Rokokobrot	Bunte Hähnchenplatte in Fruchtiger Soße dazu Gemüsemix Rokokobrot	Gemüse-Kartoffelgulasch mit Kichererbsen dazu Rokokobrot	Chimone "Mediterrane Art" mit Cavappoli und Sardinen dazu Rokokobrot	Frühjahrsbrotchen mit Kirschen dazu Zitrone Saft	Gemüsefilet mit Butter (F. 2)
	1, 2, 3, F, B	3, H, C	3	3, I	8, F, G	I	Kompost

Jedes Essen kann gewürzt werden, jedoch behält sich die Küche vor, dieses Essen nach den Richtlinien der DGE für die Reduktionskriterien im Rahmen ihres Ökologischen Herstellungs.

Zusatzstoffe: 1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmitteln, 4 mit Geschmacksverstärkern, 5 gewürzt mit Propylol, 7 mit Süßstoff, 8-Schwefelwasserstoff, 9 Allergene, B- Stabilisatoren, C- Salze, D- Emulgator, E- Süßholz, F- Quarzstaub, G- Dioxid, H- Flack, I- Malt, J- Salz, K- Konservierungsstoffe, L- Emulgator und Lebensmittelzusatzstoffe, M- Konservierungsstoffe, N- Konservierungsstoffe, O- Konservierungsstoffe, P- Konservierungsstoffe, Q- Konservierungsstoffe und Salze

Montag 23.3.15
 Saugedruck Gebäck, Kartoffeln

Dienstag 24.3.15
 Brotweizel, Röstgemüse, Salzkartoffeln

Mittwoch 25.3.15
 Rührei mit Schinken, Gemüse, Kartoffeln

Donnerstag 26.3.15
 Hackbraten, Rahmporree, Kartoffeln

Freitag 27.3.15
 Spaghetti Carbonara

Samstag 28.3.15
 Putencurry, Butterreis

Sonntag 29.3.15
 Schmitzel, Bräunehohl, Kartoffeln

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrouinen

Ablaufpläne ADLs

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrouninen

Kochvorgang:

Bouletten mit Kartoffeln und Mischgemüse

Zutaten zusammenstellen:

250g Rinder-Hackfleisch
1 Zwiebel
Fett\Öl
Schrippe
Ei
300gr. Kartoffel
Dose mit gemischten Gemüse

CHECK (habe ich alles)

Zutaten vorbereiten:

Dose öffnen
Zwiebeln schneiden
Schrippe einweichen
Kartoffeln schälen und schneiden

CHECK (ist alles vorbereitetes)

Zubereitung:

Kartoffeln Kochen
Hackfleisch mit Schrippe und Ei und Gewürzen vermengen
Bouletten formen
Gemüse dünsten
Bouletten braten

CHECK (Reihenfolge eingehalten?)

BON APPETIT

Handlungsrouninen mit
Monitoring erarbeiten

angelehnt an Gillen 2009

modifiziert von S. Ettl

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrouninen

Ziel – Idee – Plan – Check (ZIP-Check)

1. Ziel			
Welches Anliegen, Problem, Ziel habe ich?			
2. Idee			
Was könnte ich tun? Ideen sammeln – jeder Einfall zählt!			
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
3. Plan			
Was will und kann ich ausprobieren: Nr.: ☐			
Wann mache ich es?			
Brauche ich noch etwas dazu?			
Ggf.: Wie merke ich es mir?			
4. Check
Reinfall? Dann zurück zu 3.		O.K.? Sonst zurück zu 3.
Super! Her mit dem nächsten Ziel!		

Handlungsrouninen mit
Monitoring erarbeiten

angelehnt an CO-OP
modifiziert von S.Ettel

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrountinen

Handlungsrountinen mit Monitoring erarbeiten

Datum	Arbeitsschritt	Unbedingt beachten...	Erledigt?
	<i>Einsatz von Klemmzange zum Nachschneiden für Leichterung Griffe</i>		

Angewandte Therapiemethoden

Modifikation der Umwelt

Behandlung in Alltagssituationen

Kompensatorische Strategien Handlungsrouninen

Arbeitsplatzgestaltung

Umgang mit Aggression

Goldenberg 2002

Vorgehen bei Störungen des Sozialverhaltens:

Vermeiden von Situationen, in denen das Problemverhalten auftreten könnte

vor allem bei aggressivem Verhalten:

- Vermeiden situativer Auslöser
- Reduktion äußerer Reize
- Reduktion und Portionierung von Anforderungen

Gillen 2009

Aggressionen vermindern

- auslösende Stimuli vermeiden
- positive Themen bevorzugen
- Alltagsanforderungen anpassen

Arbeit mit Bezugspersonen/Angehörigen

Götze & Kolster 2013:

- Aufklärung über das Störungsbild, Hinweis auf mögliche Gefahren
- Gemeinsame Gespräche im Rahmen von Sozialtherapie, Neuropsychologie oder interdisziplinären Teams

Was machen wir ?

-
- Teilnahme von Betreuern /Angehörigen an Therapien
 - Interdisziplinäre Teams
 - Austausch mit Angehörigen über aktuelle Alltagsprobleme per mail oder telefonisch

Hindernisse und Ressourcen

Hindernisse im Therapieverlauf

Ressourcen im Therapieverlauf

- Kollegiale Beratung
- Supervision
- Eigenreflektion mit Videos
- Interdisziplinäres Team
- Zeitfaktor
- Strukturierungshilfen aus der Literatur

Ziele des Vortrags waren:

- Information über ein komplexes Störungsbild
- Empfehlungen zu ergotherapeutischer Diagnostik und Therapie
- Hinweise zu Möglichkeiten der Abgrenzung und Entlastung bei „schwierigen Patienten“
- Darstellung der Bedeutung von Betätigung/ Aktivität im Alltag für Diagnostik und Therapie

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Sprechen Sie uns an, hier und jetzt
oder unter**

ergotherapie.fdh@fdst.de

Baum, CM et al (2013). Executive Function Performance Test (EFPT)

Berding, Culp (2014). Kollegiale Beratung im Kontext von Logopädie und Ergotherapie. ET Reha, 53.Jg. Nr.12

Cranenburg, Ben van (2007). Neurorehabilitation. Urban & Fischer Verlag/Elsevier

Dawson DR, Gaya A, Hunt A, et al. (2009). Using the Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP) with adults with executive dysfunction following traumatic brain injury. Canadian Journal of Occupational Therapy, Volume 76, Nr 2

Dawson DR, Binns MA, Hunt A, et al. (2013). Occupation-Based Strategy Training for Adults With Traumatic Brain Injury: A Pilot Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 94(10):1959-63.

Fisher, A (2013). AMPS. Band 1: Entwicklung, Standardisierung und Anwenderhandbuch. 7.überarb. Auflage

Gillen, Glen (2009). Cognitive and Perceptual Rehabilitation. Optimizing Function. Elsevier.

Goldenberg G (Hg.) (2002). Neuropsychologie im Alltag. Stuttgart: Thieme

Goldenberg, G (2007). Neuropsychologie: Grundlagen, Klinik, Rehabilitation (4.Aufl.). München: Urban & Fischer.

Literatur (Auszug)

Goverover Y, Johnston MV, Togliola J, et al. (2007). Treatment to improve self-awareness in persons with acquired brain injury. *Brain Injury*, 21(9): 913-23.

Götze R & Zenz K. (2010). Neuropsychologisches Befundsystem für die Ergotherapie. 3. Auflage. Springer Verlag.

Götze R & Kolster F (2009). Störungen exekutiver Funktionen. In Habermann, C & Kolster, F (Hg.). *Ergotherapie im Arbeitsfeld Neurologie* (2. überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.

Götze R & Kolster F (2013). Fortbildungskript HoDT Aufbaukurs.

Müller SV, Hildebrandt H, Münte TF (2004). Kognitive Therapie bei Störungen der Exekutivfunktionen. Ein Therapiemanual; Göttingen: Hogrefe

Müller SV, Harth S, Klaue U (2008). „Dann mache ich mir einen Plan !“. Dortmund: vml

Müller SV (2013). Störungen der Exekutivfunktionen. Göttingen: Hogrefe

Prigatano GP (2004). Neuropsychologische Rehabilitation. Berlin Heidelberg: Springer

Prosiegel M (2006). Neuropsychologische Störungen und ihre Rehabilitation. Pflaum

S2e – Leitlinie Diagnostik und Therapie von exekutiven Dysfunktionen bei neurologischen Erkrankungen, AWMF-Register-Nr. 030/125 (Stand 18.11.2011)

RehaCom. www.hasomed.de

<http://www.neuropage.nhs.uk/>