

# Ergotherapie Zielerreichungsskala (Goal Attainment Scaling)

Ziele vereinbart am: Von: 15.08. Frau Musterfrau, Elke und Ergotherapeut		Klient Musterfrau, Elke	Therapeut D.S.
Anliegen	Anziehen	Trinken	Selbst auf die Toilette umsetzen
Ggf. Indikator			
<b>+2</b> viel mehr als erwartet	Frau M. zieht sich bis zum 20.08. selbstständig die Oberbekleidung im freien Sitz an der Bettkante an.	Frau M. trinkt selbstständig ohne Andickungsmittel bis zum 25.08. (ohne Supervision).	Frau M. kann sich vom Rollstuhl selbstständig auf die Toilette setzen und zurück bis zum 25.08.
<b>+1</b> mehr als erwartet	Frau M. zieht sich bis zum 25.08. selbstständig die Oberbekleidung im freien Sitz an der Bettkante an.	Frau M. trinkt selbstständig ohne Andickungsmittel bis zum 30.08. (ohne Supervision).	Frau M. kann sich vom Rollstuhl selbstständig auf die Toilette setzen und zurück bis zum 29.08.
<b>0</b> erwartetes Ergebnis	Frau M. zieht sich bis zum 29.08. selbstständig die Oberbekleidung im freien Sitz an der Bettkante an.	Frau M. trinkt selbstständig ohne Andickungsmittel bis zum 07.09. (ohne Supervision).	Frau M. kann sich vom Rollstuhl selbstständig auf die Toilette setzen und zurück (bis zum 15.09.).
<b>-1</b> weniger als erwartet (jetziger Zustand)	Frau M. zieht sich bis zum 29.08. selbstständig die Oberbekleidung an der Bettkante an und benötigt leichte taktile Hilfestellung.	Frau M. trinkt selbstständig ohne Andickungsmittel mit Supervision.	Frau M. fährt selbstständig in das Badezimmer und bereitet die Toilette und den Rollstuhl selbstständig für den Toilettentransfer vor. Beim Transfer benötigt sie Supervision während der Standphase.
<b>-2</b> viel weniger als erwartet	Frau M. zieht sich bis zum 29.08. selbstständig die Oberbekleidung an der Bettkante an und benötigt dabei viel Hilfestellung, damit sie nicht zur Seite fällt.	Frau M. trinkt mit 1 Löffel Andickungsmittel und verbal-taktilem therapeutischer Hilfestellung bei der pharyngealen Phase.	Frau M. wird in das Badezimmer geschoben und bereitet die Toilette und den Rollstuhl selbstständig für den Toilettentransfer vor. Beim Transfer benötigt sie taktile Hilfestellung während der Standphase.
Verlauf			